

Фармакологічне лікування пацієнтів із деменцією

До вашої уваги наведено графічне узагальнення настанов Національного інституту здоров'я і клінічного вдосконалення Великої Британії (NICE, 2018) щодо лікування пацієнтів із найпоширенішими формами деменції. Зважаючи на велику різноманітність симптомів згаданої патології, терапевтичні інтервенції таких хворих потребують індивідуального підходу та відповідного підбору медикаментозних засобів.

Хвороба Альцгеймера	Легка	Помірна	Тяжка
ПАЦІЄНТИ З УПЕРШЕ ДІАГНОСТОВАНОЮ ХВОРОБОЮ АЛЬЦГЕЙМЕРА	Рекомендовано як засіб монотерапії Донепезил	Галантамін Ривастигмін	Рекомендовано як засіб монотерапії Мемантин
ПАЦІЄНТИ, ЯКІ НЕ ПЕРЕНОСЯТЬ ІНГІБІТОРИ АХЕ ЧИ МАЮТЬ ПРОТИПОКАЗАННЯ ДО ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ		Рекомендовано як засіб монотерапії Мемантин	
ПАЦІЄНТИ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬ ІНГІБІТОРИ АХЕ		Розглянути можливість додаткової терапії Мемантин	Запропонувати як засіб додаткової терапії Мемантин
Не припиняйте прийом інгібіторів АХЕ лише через тяжкість проявів хвороби			

ХТО МОЖЕ ПРИЗНАЧАТИ МЕДИКАМЕНТОЗНУ ТЕРАПІЮ ПРИ ХВОРОБІ АЛЬЦГЕЙМЕРА?

ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ, ЯКІ НЕ ПРИЙМАЮТЬ: Ривастигмін, Донепезил, Галантамін, Мемантин

Лікування слід почати лише після консультації вузькопрофільних спеціалістів:

Фахівці вторинної ланки

Психіатр, Геріатр, Невролог

Інші медичні працівники, якщо вони мають досвід діагностики та лікування хвороби Альцгеймера

Сімейні лікарі, Медична сестра-консультант, Медична сестра широкого профілю

У разі прийняття рішення про початок медикаментозної терапії перше втручання можуть здійснювати фахівці первинної ланки

ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ПОСТІЙНО ПРИЙМАЮТЬ: Ривастигмін, Донепезил, Галантамін, Мемантин

Лікарі первинної ланки можуть призначити Мемантин без консультації з вузькопрофільними спеціалістами

Інші форми деменції

ДЕМЕНЦІЯ З ТІЛЬЦЯМИ ЛЕВІ	Легка	Помірна	Тяжка
Протипоказань немає	Запропонувати Донепезил, Ривастигмін		Розглянути можливість призначення Донепезил, Ривастигмін
Погана переносимість	Розглянути можливість призначення Галантамін		
Інгібітори АХЕ протипоказані	Розглянути можливість призначення Мемантин		

ПАЦІЄНТИ ІЗ СУДИННОЮ ДЕМЕНЦІЄЮ

Розглянути як засіб лікування: Ривастигмін, Галантамін, Донепезил, Мемантин

У разі наявності таких коморбідних станів:
Хвороба Альцгеймера, Хвороба Паркінсона, Деменція з тільцями Леві

ПАЦІЄНТИ З ФРОНТОТЕМПОРАЛЬНОЮ ДЕМЕНЦІЄЮ ЧИ КОГНІТИВНОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ, ЩО СПРИЧИНЕНІ РС

Не рекомендовано: Ривастигмін, Галантамін, Донепезил, Мемантин

ПАЦІЄНТИ З ДЕМЕНЦІЄЮ ПРИ ХВОРОБІ ПАРКІНСОНА

Рекомендації щодо фармакологічного ведення таких пацієнтів наведено в настановах «Parkinson's disease in adults» (NICE, 2017)

Примітки: АХЕ – інгібітори ацетилхолінестерази; РС – розсіяний склероз.

Адаптовано згідно з Pink J. et al. Dementia: assessment, management and support: summary of updated NICE guidance. *BMJ*. 2018. P. 361.

Оригінальний текст документа читайте на сайті www.bmj.com