

Порівняння схем медикаментозної терапії відповідно до національних та міжнародних рекомендацій із лікування нейропатичного болю

Рекомендації	Канадське товариство з вивчення болю (CPS, 2014)	Спеціалізована група з нейропатичного болю Міжнародної асоціації з вивчення болю (NeuPSIG/IASP, 2015)	Національний інститут здоров'я та клінічної майстерності Великої Британії (NICE, 2017)	Європейська федерація неврологічних товариств (EFNS, 2010)		
Невралгія трійчастого нерва	<i>Перша лінія:</i> карбамазепін		<i>Перша лінія:</i> карбамазепін <i>Друга лінія:</i> зверніться за консультацією до лікаря	<i>Перша лінія:</i> карбамазепін, окскарбазепін <i>Друга лінія:</i> хірургічне лікування		
Тип нейропатичного болю	Усі види нейропатичного болю			Центральний нейропатичний біль	Діабетична нейропатія	Постгерпетична невралгія
<i>Препарати першої лінії</i>	Габапентин Прегабалін Дулоксетин Венлафаксин ТЦА	Габапентин ^a Прегабалін Дулоксетин Венлафаксин ТЦА	Габапентин Прегабалін Дулоксетин Амітриптилін	Габапентин Прегабалін Амітриптилін ТЦА	Габапентин Прегабалін Дулоксетин Венлафаксин ПВ ТЦА	Габапентин Прегабалін ТЦА Лідокаїнові пластирі ^b
<i>Препарати другої лінії</i>	Трамадол Опіоїди KB: • Морфін • Оксикодон • Фентаніл • Гідроморфін	Трамадол Пластирі з 8 % вмістом капсаїцину* Лідокаїнові пластирі*	Якщо початкове лікування неефективне або погано переноситься, спробуйте один із решти вказаних вище препаратів; дійте так само в разі неефективності другого або третього препарату	Трамадол Опіоїди	Трамадол ^c	Опіоїди: • Оксикодон • Морфін • Метадон Капсаїцин для місцевого застосування
<i>Препарати третьої лінії</i>	Канабіноїди	Сильні опіоїди: • Оксикодон • Морфін Ботулінічний токсин типу A*	Трамадол: тільки в гострій фазі Капсаїцин для місцевого застосування*	Опіоїди	Опіоїди: Оксикодон	
<i>Препарати четвертої лінії</i>	Метадон Талентадол Ламотриджин Топірамат Вальпроєва кислота Циталопрам Есциталопрам Пароксетин Капсаїцин для місцевого застосування Лідокаїн для місцевого застосування ^d Ботулінічний токсин		Рекомендації фахівця: • Екстракт посівної коноплі • Лакосамід • Ламотриджин • Леветирacetам • Морфін • Окскарбазепін • Топірамат • Трамадол тривалої дії • Венлафаксин		Ламотриджин ^e Канабіноїди ^f	

Примітки: ТЦА — трициклічні антидепресанти; ПВ – із пролонгованим вивільненням; KB – контрольоване вивільнення; * – при периферичній нейропатії; ^a – габапентин зі швидким вивільненням; ^b – лідокаїн для місцевого застосування з його гарною переносимістю може бути препаратом першої лінії для літніх осіб, особливо за наявності скарги щодо побічних реакцій на пероральні препарати з боку центральної нервової системи; ^c – трамадол можна розглянути як препарат першої лінії для пацієнтів зі значним загостренням болю, особливо в комбінації з ацетамінофеном, або для пацієнтів із переважанням супутнього болю ненейропатичної природи; ^d – лідокаїн для місцевого застосування може бути препаратом другої лінії при постгерпетичній невралгії; ^e – призначення ламотриджину можна розглянути в разі центрального постінсультного болю або болю при спинномозковій травмі з непевним ураженням спинного мозку та динамічних механічних алодиніях; ^f – при розсіяному склерозі.